

ID	D001
Dernière mise à jour de la fiche technique	15/09/2025
Domaine	Déterminants de la santé Consommation de tabac
Nom de l'indicateur - court	Prévalence des fumeurs quotidiens
Justificatif	La consommation de tabac est l'une des principales causes de multiples maladies, notamment certains cancers, les maladies cardio-neuro-vasculaires et les maladies respiratoires. En outre, le tabagisme passif contribue également de manière significative à ces maladies chez les non-fumeurs (1). Il est estimé que 11 % des décès au Luxembourg étaient attribuables au tabagisme (2). L'OMS recommande l'implémentation d'un ensemble de mesures globales de lutte contre le tabagisme afin de réduire la prévalence et la morbidité et mortalité attribuables au tabagisme. Étant signataire de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, le Luxembourg implémente activement les mesures définies par MPOWER (3,4).
Nom de l'indicateur - détaillé	Proportion (%) des personnes âgées de 16 ans et plus ayant indiqué fumer quotidiennement
Définition de l'indicateur	Pourcentage des personnes âgées de 16 ans et plus ayant indiqué de fumer quotidiennement au moment de l'enquête. La définition inclut l'usage de la shisha, mais exclut les cigarettes électroniques. Les participants s'identifient eux-mêmes comme fumeurs selon leur propre perception.
Calcul de l'indicateur	Pourcentage Dénominateur : Nombre de personnes 16 ans et plus participant à l'enquête Numérateur : Nombre de personnes participant à l'enquête et déclarant de fumer quotidiennement Ajustement : Non Note : Avant 2018, l'enquête se basait sur les personnes âgées de 15 ans et plus.
Sous-groupes	Stratification par sexe pour les années 2012-2024. Stratification par catégorie d'âge pour les années 2012-2024 : 16-24 ans, 25-34 ans, 35-49 ans, 50-64 ans, 65 ans et plus.
Comparaison internationale	Comparaison de la prévalence des fumeurs quotidiens au Luxembourg avec : l'Allemagne (2021), la Belgique (2018), la France (2023), les Pays-Bas (2023) et la Suisse (2022).
Couverture des données	Temporelle : 2012-2024 Géographique : nationale Population résidente de 16 ans et plus. L'enquête est basée sur un échantillon de la population résidente âgée de 16 ans et plus. L'échantillon est tiré d'un panel de 17 000 personnes et il est redressé pour être représentatif de la population résidente selon les variables suivantes : âge, sexe, nationalité (luxembourgeoise, portugaise, autre), région de résidence, activité professionnelle (oui/non).
Constats	La proportion de personnes âgées de 16 ans et plus qui fument quotidiennement a montré une tendance à la hausse entre 2018 (14,5 %) et 2022 (20,3 %). Depuis 2022, il y a eu une tendance à la baisse, et en 2024, une proportion similaire à 2018 est observée : 14,7 % fument quotidiennement. Depuis 2018, le tabagisme quotidien est presque aussi fréquent chez les femmes que chez les hommes (en 2024, 13,3 % respectivement 15,8 %).

	<p>La prévalence des fumeurs quotidiens ou occasionnels, est la plus prononcée dans les groupes d'âge les plus jeunes : 16-24 ans, 25-34 ans et 35-49 ans.</p> <p>La prévalence de tabagisme quotidien au Luxembourg (14,7 %) est au même niveau que les Pays-Bas (13,2 %), l'Allemagne (14,6 %), la Belgique (15,4 %), et la Suisse (16,1 %), et plus basse que la France (23,1%).</p>
Limitations	<p>Changement de méthodologie entre 2018 et 2019 avec un passage d'une collecte mixte d'entretien téléphonique et en ligne vers une collecte uniquement en ligne depuis 2019. Globalement, les enquêtes peuvent être sujettes à un biais de participation. En outre, les enquêtes par questionnaire autoadministré exposent à un biais d'information qui peut impacter la qualité des résultats.</p>
Remarques	<p>L'enquête de tabagisme au Luxembourg de 2024 a montré que 5 % de la population enquêtée indiquait fumer la shisha et 12 % la cigarette électronique (le vapotage) occasionnellement ou quotidiennement. Les prévalences chez les jeunes (16-24 ans) qui fumaient la shisha (12 %) et la cigarette électronique (26 %) étaient particulièrement hautes.</p> <p>Pour la comparaison internationale, les données ne sont pas publiées annuellement par tous les pays, il s'agit donc de la dernière année disponible.</p> <p>La prévalence de la consommation de tabac quotidienne est également investiguée tous les 5 ans par l'enquête EHIS (<i>European Health Interview Survey</i>). Dans la dernière enquête EHIS de 2019, 11 % des personnes de 15 ans ou plus indiquaient fumer de façon quotidienne, une baisse par rapport à 14 % en 2014.</p>
Indicateurs associés	<p>D002 - Consommation de tabac pendant la grossesse D003 - Tabagisme passif pendant la grossesse</p>
Source des données	<p>Fondation Cancer, DiSa. Enquête tabagisme OCDE</p>
Fréquence d'actualisation de la source	<p>Annuelle</p>
Références	<ol style="list-style-type: none"> 1. OMS. Principaux repères. Tabac : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/tobacco 2. IHME. L'étude GBD 2021 : https://www.healthdata.org/ 3. OMS. FCTC : https://fctc.who.int/fr/convention 4. OMS. MPOWER : https://www.who.int/initiatives/mpower
Liens utiles	<ul style="list-style-type: none"> • Fondation Cancer. Ma vie sans tabac : https://www.maviesanstabac.lu • Génération Sans Tabac : https://www.generationsanstabac.lu • SanteSecu.lu. La consommation de substances nocives des enfants et adolescents en âge scolaire. HBSC Luxembourg 2022 : https://sante.public.lu/fr/publications/h/factsheet-substance-consumption.html