

<b>ID</b>	D002
<b>Dernière mise à jour de la fiche technique</b>	01/10/2024
<b>Domaine</b>	Déterminants de la santé Consommation de tabac Enfance
<b>Nom de l'indicateur - court</b>	Consommation de tabac pendant la grossesse
<b>Justificatif</b>	Le tabagisme augmente le risque de complications pendant la grossesse, telles qu'un décollement du placenta (1). L'exposition des enfants à naître au tabagisme maternel augmente le risque de malformations congénitales, de mortinatalité, de naissance prématurée, de faible poids de naissance et de décès au cours de la première année de vie. Il a en outre été associé à des risques à long terme pour la santé, notamment le diabète de type 2, l'hypertension ainsi que des troubles du comportement (1,2). Des associations similaires ont été identifiées pour l'exposition au tabagisme passif (2–4).
<b>Nom de l'indicateur - détaillé</b>	Proportion (%) de femmes ayant accouché et indiquant une consommation de tabac durant le troisième trimestre de grossesse
<b>Définition de l'indicateur</b>	Pourcentage de femmes ayant indiqué une consommation de tabac durant le 3e trimestre de grossesse parmi toutes les femmes ayant accouché des enfants vivants ou mort-nés durant l'année de référence, par fréquence de consommation : quotidienne, occasionnelle.
<b>Calcul de l'indicateur</b>	Pourcentage Dénominateur : Nombre de femmes ayant accouché des enfants vivants ou mort-nés au Luxembourg Numérateur : Nombre de femmes ayant accouché des enfants vivants ou mort-nés au Luxembourg durant l'année de référence et ayant indiqué une consommation quotidienne ou occasionnelle de tabac durant le 3e trimestre de grossesse
<b>Sous-groupes</b>	Stratification par catégories d'âge (< 25 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, >= 45 ans) pour les trois années groupées de 2019 à 2021
<b>Comparaison internationale</b>	Non fournie
<b>Couverture des données</b>	Temporelle : 2011 à 2021. Moyenne sur trois ans (2019-2020-2021) pour les résultats par catégories d'âge Couverture géographique : nationale Population cible : femmes résidentes et non-résidentes ayant accouché au Luxembourg
<b>Constats</b>	La consommation de tabac occasionnelle et quotidienne au cours du 3e trimestre de la grossesse a diminué de près de la moitié entre 2011 et 2021. En 2021 environ une femme sur 18 (5,6%) a indiqué avoir fumé de façon quotidienne et une femme sur 100 (1,1%) de façon occasionnelle durant le 3e trimestre de grossesse. La consommation de tabac quotidienne est plus fréquente chez les femmes de moins de 25 ans (14,6%) que parmi les femmes des autres catégories d'âges (25-34 ans 5,3%, 35-44 ans 4,5% et ≥45 ans 4,5%).
<b>Limitations</b>	La méthodologie de collecte de l'information (voie verbale par le prestataire de soins) expose à un biais d'information
<b>Remarques</b>	Indicateur basé sur les femmes pour lesquelles l'information concernant la consommation de tabac au cours de la grossesse était disponible ; collecte de données de routine par le prestataire de soins (2011-2021 information disponible pour 97,4% des femmes). Indicateur recommandé par EuroPeristat (Indicateur R8)
<b>Indicateurs associés</b>	D001 - Prévalence des fumeurs D003 - Tabagisme passif pendant la grossesse D007 - Consommation d'alcool pendant la grossesse

<b>Source des données</b>	DiSa, Surveillance de la Santé Périnatale (PERINAT)
<b>Références</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salihu HM, Wilson RE. Epidemiology of prenatal smoking and perinatal outcomes. Early Hum Dev. 2007 Nov 1;83(11):713–20.</li> <li>2. Banderali G, et al. Short and long term health effects of parental tobacco smoking during pregnancy and lactation: a descriptive review. J Transl Med. 2015 Oct 15;13:327.</li> <li>3. WHO. Tobacco control to improve child health and development: thematic brief. <a href="https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240022218">https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240022218</a></li> <li>4. Leonardi-Bee J, et al. Secondhand Smoke and Adverse Fetal Outcomes in Nonsmoking Pregnant Women: A Meta-analysis. Pediatrics. 2011 Apr 1;127(4):734–41.</li> </ol>
<b>Liens utiles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sante.lu. Surveillance de la Santé Périnatale 2017-2019 au Luxembourg. <a href="https://sante.public.lu/fr/publications/s/surveillance-sante-perinatale-2017-2019.html">https://sante.public.lu/fr/publications/s/surveillance-sante-perinatale-2017-2019.html</a></li> <li>• ObSanté. Eng gesond Zukunft : un rapport sur la santé des enfants au Luxembourg. <a href="https://sante.public.lu/fr/espace-obsante/rapport-thematique-sante-enfant.html">https://sante.public.lu/fr/espace-obsante/rapport-thematique-sante-enfant.html</a></li> <li>• Sante.lu. Enceinte sans tabac. <a href="https://sante.public.lu/fr/publications/d/depliant-enceinte-sans-tabac-2019-fr-de.html">https://sante.public.lu/fr/publications/d/depliant-enceinte-sans-tabac-2019-fr-de.html</a></li> <li>• Fondation Cancer. Tabagisme et grossesse. <a href="https://www.maviesanstabac.lu/tabagisme-grossesse/">https://www.maviesanstabac.lu/tabagisme-grossesse/</a></li> <li>• Génération sans Tabac. <a href="https://www.generationsanstabac.lu">https://www.generationsanstabac.lu</a></li> </ul>