

ID	D003
Dernière mise à jour de la fiche technique	17/07/2024
Domaine	Déterminants de la santé Consommation de tabac Enfance
Nom de l'indicateur - court	Tabagisme passif pendant la grossesse
Justificatif	L'exposition au tabagisme passif durant la grossesse augmente le risque de mortalité (enfants nés sans vie), de malformations congénitales, de naissance prématurée et de faible poids de naissance (1–3).
Nom de l'indicateur - détaillé	Proportion (%) de femmes ayant accouché et indiquant une exposition au tabagisme passif durant la grossesse.
Définition de l'indicateur	Pourcentage de femmes ayant indiqué une exposition au tabagisme passif durant la grossesse parmi toutes les femmes ayant accouché des enfants vivants ou mort-nés durant l'année de référence, par type d'exposition : de manière intermittente, de manière continue.
Calcul de l'indicateur	Pourcentage Dénominateur : Nombre de femmes ayant accouché des enfants vivants ou mort-nés au Luxembourg Numérateur : Nombre de femmes ayant accouché des enfants vivants ou mort-nés au Luxembourg durant l'année de référence et ayant indiqué une exposition au tabagisme passif de manière intermittente ou continue pendant leur grossesse Ajustement appliqué : non
Sous-groupe	Stratification par catégories d'âge (< 25 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, >= 45 ans) pour les trois années groupées de 2019 à 2021
Comparaison internationale	Non fournie
Couverture des données	Temporelle : de 2011 à 2021 ; Moyenne sur trois ans (2019-2020-2021) pour les résultats par catégories d'âge Couverture géographique : nationale Population cible : femmes résidentes et non-résidentes ayant accouché au Luxembourg
Constats	L'exposition continue au tabagisme passif durant la grossesse a diminué de plus de la moitié entre 2011 à 2018, passant de 11,6% à 5,0%. De 2019 à 2021 cette tendance a été inversée à la hausse (7,1% en 2021). Par contre, l'exposition au tabagisme passif de manière intermittente montre une évolution continue à la baisse et atteint 8,1% en 2021. Les femmes enceintes de moins de 25 ans sont particulièrement exposées au tabagisme passif, pour les trois années de 2019 à 2021, 19,1% ont indiqué une exposition intermittente et 15,5% une exposition continue durant la grossesse contre 10,1% et 6,1% chez les femmes entre 25 et 34 ans, par exemple.
Limitations	La méthodologie de collecte de l'information (voie verbale par le prestataire de soins) expose à un biais d'information.
Remarques	Indicateur basé sur les femmes pour lesquelles l'information concernant l'exposition au tabagisme passif au cours de la grossesse était disponible ; collecte de données de routine par le prestataire de soins (2011-2021 information disponible pour 97,4% des femmes).
Indicateurs associés	D001 - Prévalence des fumeurs D002 – Consommation de tabac pendant la grossesse D007 – Consommation d'alcool pendant la grossesse

Source des données	DiSa, Surveillance de la Santé Périnatale, Luxembourg (PERINAT)
Références	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banderali G, et al. Short and long term health effects of parental tobacco smoking during pregnancy and lactation: a descriptive review. J Transl Med. 2015 Oct 15;13:327. 2. WHO. Tobacco control to improve child health and development: thematic brief. https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240022218 3. Leonardi-Bee J, et al. Secondhand Smoke and Adverse Fetal Outcomes in Nonsmoking Pregnant Women: A Meta-analysis. Pediatrics. 2011 Apr 1;127(4):734–41.
Liens utiles	<ul style="list-style-type: none"> • Sante.lu. Surveillance de la santé périnatale https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/informations-donnees/perinat.html • Sante.lu. Eng gesond Zukunft : un rapport sur la santé des enfants au Luxembourg. http://sante.public.lu/fr/publications/r/rapport-thematique-sante-enfant.html • Sante.lu. Enceinte sans tabac https://sante.public.lu/fr/publications/d/depliant-enceinte-sans-tabac-2019-fr-de.html • Fondation Cancer. Tabagisme et grossesse. https://www.maviesanstabac.lu/tabagisme-grossesse/ • Génération sans Tabac. https://www.generationsanstabac.lu