

ID	D007
Dernière mise à jour de la fiche technique	11/07/2024
Domaine	Déterminants de la santé Consommation d'alcool Enfance
Nom de l'indicateur - court	Consommation d'alcool pendant la grossesse
Justificatif	Seule une absence totale de consommation d'alcool pendant la grossesse est sans danger, c'est pourquoi il est recommandé de s'abstenir complètement de boire de l'alcool pendant la grossesse. La consommation d'alcool durant la grossesse augmente le risque de mortinatalité, de naissance prématurée et de faible poids de naissance ainsi que des malformations congénitales et des troubles du développement dont les conséquences durent toute la vie (1).
Nom de l'indicateur - détaillé	Proportion (%) de femmes ayant accouché et indiquant avoir consommé de l'alcool pendant la grossesse
Définition de l'indicateur	Pourcentage de femmes indiquant avoir consommé de l'alcool durant la grossesse parmi toutes les femmes ayant accouché des enfants vivants ou mort-nés durant l'année de référence, par fréquence de consommation : quotidienne, occasionnelle
Calcul de l'indicateur	Pourcentage Dénominateur : Nombre de femmes ayant donné naissance à un ou plusieurs enfants vivants ou mort-nés au Luxembourg Numérateur : Nombre de femmes ayant donné naissance à des enfants vivants ou mort-nés au Luxembourg durant l'année de référence et ayant indiqué une consommation quotidienne ou occasionnelle d'alcool.
Sous-groupes	Stratification par catégories d'âge (< 25 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, >= 45 ans) pour les trois années groupées de 2019 à 2021
Comparaison internationale	Non fournie
Couverture des données	Temporelle : 2011 à 2021. Moyenne sur trois ans (2019-2020-2021) pour les résultats par catégorie d'âge Géographique : nationale Population cible : femmes résidentes et non-résidentes ayant accouché au Luxembourg
Constats	En 2011, 8,6% des femmes ayant accouché ont déclaré avoir consommé de l'alcool de façon quotidienne ou occasionnelle durant la grossesse. Cette proportion a diminué à 1,9% en 2021. Les déclarations de consommation quotidienne d'alcool étaient stables entre 0,2 et 0,3% au cours de la période 2011-2021. Parmi les femmes de moins de 25 ans qui accouchaient entre 2019 et 2021, cette proportion était la plus élevée ; 3,7% indiquaient une consommation quotidienne ou occasionnelle d'alcool durant la grossesse.
Limitations	Globalement, les enquêtes peuvent être sujettes à un biais de participation. En outre, les enquêtes par questionnaire autoadministré exposent à un biais d'information qui peut impacter la qualité des résultats.
Références	1. Dejong K, Olyaei A, Lo JO. Alcohol Use in Pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 2019 Mar;62(1):142–55.
Remarques	Indicateur basé sur les femmes pour lesquelles l'information concernant la consommation d'alcool au cours de la grossesse était disponible (2011-2021 information disponible pour 99% des femmes).
Indicateurs associés	D002 - Consommation de tabac pendant la grossesse D004 - Consommation d'alcool chez les 15+ D005 - Episodes d'alcoolisation excessive chez les 15+ D006 - Consommation d'alcool chez les écoliers de 11 à 12 ans

Source des données	DiSa, Surveillance de la Santé Périnatale, Luxembourg (PERINAT)
Liens utiles	<ul style="list-style-type: none">• Sante.lu. Surveillance de la santé périnatale https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/informations-donnees/perinat.html• Sante.lu. Informations pour votre grossesse, 0% Alcool https://sante.public.lu/fr/publications/z/zero-alcool-grossesse-fr-de.html• Sante.lu. Eng gesond Zukunft : un rapport sur la santé des enfants au Luxembourg https://sante.public.lu/fr/publications/r/rapport-thematique-sante-enfant.html• Sante.lu. Plan d'Action Luxembourgeois de réduction du Mésusage de l'Alcool «PALMA» 2020 – 2024 https://sante.public.lu/fr/publications/p/plan-national-alcool-2020-2024.html